

# Desinfektionsplan für den Kindergarten

## - Noro-Viren -



Dr. Schumacher

Noroviren sind bereits ab 2 Erkrankungen meldepflichtig gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 Infektionsschutzgesetz.  
Gesundheitliche Anforderungen, Mitwirkungspflicht gem. § 34 Infektionsschutzgesetz.

Die Eltern aller Kinder sollten über die aufgetretene Durchfallerkrankung informiert werden. Das erkrankte Kind ist bis zur Abholung durch die Eltern möglichst getrennt von den übrigen Kindern zu betreuen. Die Person, die das erkrankte Kind betreut, sollte nicht in die Essenzubereitung und -verteilung eingebunden werden. Kinder, die das 6. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und an einer infektiösen Gastroenteritis erkrankt sind, dürfen eine Gemeinschaftseinrichtung nicht besuchen.

PSP-000691 07/2013

Was	Wann	Womit	Konzentration/ Einwirkzeit	Wie	Wer
 <p><b>Haut &amp; Hände</b> Desinfektion</p>	<p><b>Hygienische Händedesinfektion</b></p> <p>Nach Kontakt mit erkrankten Kindern. Nach Kontakt mit Blut, Ausscheidungen, Erbrochenem. Nach Kontakt mit kontaminierten Gegenständen und Flächen. Mehrmals täglich. Bei Bedarf.</p>	<p><b>ASEPTOMAN VIRAL</b></p>	<p>Konz. - 1 Min.</p>	<p>Ausreichende Menge gründlich in die trockenen Hände einreiben. Besondere Berücksichtigung von Hauptkontaktstellen, Fingerspitzen, Daumen und Nagelfalz. Die Hände müssen während der gesamten Applikationszeit durch das konz. Präparat feucht gehalten werden.</p>	<p>Alle Mitarbeiter</p>
 <p><b>Fläche</b></p>	<p><b>Fieberthermometer</b></p> <p>Direkt nach Gebrauch.</p>	<p><b>DESCOCEPT PUR</b></p>	<p>Konz. - 1 Min.</p>	<p>Mit desinfektionsmittelgetränktem Einmaltuch vollständig abwischen.</p>	<p>Alle Mitarbeiter</p>
	<p><b>Wickeltischauflage</b></p> <p>Nach Gebrauch.</p>	<p><b>DESCOCEPT PUR</b></p>	<p>Konz. - 1 Min.</p>	<p>Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen.</p>	<p>Alle Mitarbeiter</p>
	<p><b>Spielzeug</b></p> <p>Sofort nach Verschmutzung mit Erbrochenem und/oder Ausscheidungen.</p>	<p><b>DESCOCEPT PUR</b> <b>ULTRASOL® active</b></p>	<p>Konz. - 1 Min. 1 % - 60 Min.</p>	<p>Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen. Vor Wiederbenutzung mit Trinkwasser abspülen.</p>	<p>Alle Mitarbeiter</p>
	<p><b>Alle Kontaktflächen, z.B. Türgriffe, Arbeitsflächen, Wickeltisch</b></p> <p>Täglich. Sofort nach Verschmutzung mit Erbrochenem und/oder Ausscheidungen.</p>	<p><b>DESCOCEPT PUR</b> <b>ULTRASOL® active</b></p>	<p>Konz. - 1 Min. 1 % - 60 Min.</p>	<p>Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen.</p>	<p>Alle Mitarbeiter</p>
	<p><b>Fußböden</b></p> <p>Täglich. Sofort nach Verschmutzung mit Erbrochenem und/oder Ausscheidungen.</p>	<p><b>ULTRASOL® active</b></p>	<p>1 % - 60 Min.</p>	<p>Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen.</p>	<p>Alle Mitarbeiter</p>
	<p><b>Toilette, Waschbecken</b></p> <p>Täglich. Nach jeder Toilettennutzung durch ein erkranktes Kind. Sofort nach Verschmutzung mit Erbrochenem und/oder Ausscheidungen.</p>	<p><b>DESCOCEPT PUR</b></p>	<p>Konz. - 1 Min.</p>	<p>Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen.</p>	<p>Alle Mitarbeiter</p>
<p>In der Kombination <b>ULTRASOL® active/ECO WIPES</b> beträgt die Standzeit maximal 8 Std.</p>					
<p><b>Sonstiges</b></p>	<p><b>Geschirr und Besteck</b></p> <p>Nach Benutzung.</p>			<p>Maschinelle Aufbereitung bei mindestens 60 °C.</p>	<p>Alle Mitarbeiter</p>
	<p><b>Schutzkleidung:</b></p> <p><b>Chemikaliendichte Schutzhandschuhe</b></p> <p>Beim Umgang mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln.</p>				<p>Alle Mitarbeiter</p>
	<p><b>Einmalhandschuhe</b></p> <p>Beim Umgang mit Ausscheidungen, Blut und Erbrochenem. Bei Bedarf.</p>			<p>Nach Gebrauch entsorgen.</p>	
	<p><b>PE-Schürze</b></p> <p>Falls die Arbeitskleidung durchnässt oder kontaminiert werden kann.</p>				

Alle Präparate zur Flächendesinfektion können im **ECO WIPES** Spendersystem eingesetzt werden.

Bei Desinfektionsmaßnahmen sind Konzentration und Einwirkzeit zu beachten. Desinfektionslösungen sind immer mit kaltem Wasser anzusetzen. Beim Umgang mit Desinfektionsmitteln, die nicht für die Anwendung am menschlichen Körper vorgesehen sind, sind Schutzhandschuhe zu tragen.  
Bei behördlich angeordneten Entseuchungen aufgrund meldepflichtiger, übertragbarer Krankheiten (§18 IfSG) sind Mittel und Verfahren aus der Desinfektionsmittelliste d. Robert Koch Institutes (§18 IfSG) anzuwenden (Hände: **ASEPTOMAN VIRAL**, Flächen: **OPTISEPT**, Instrumente: **DESCOTON FORTE**).  
Die Überprüfung auf Vollständigkeit und Richtigkeit liegt beim Anwender.

**Dr. Schumacher GmbH**

Am Roggenfeld 3, D-34323 Malsfeld  
Telefon: +49 5664 9496-0  
Email: post@schumacher-online.com  
www.schumacher-online.com



Stempel/Unterschrift